



BOLLETTINO DI DIFESA DELLA VITE

N° 7/2020 del 28/05/2020

Fase fenologica. La fioritura è iniziata per tutte le varietà e nelle zone ben esposte la vite sta raggiungendo la fase di allegagione; la croatina è ancora nella fase di piena fioritura. La fase fenologica più delicata della vite, la fioritura, sta avvenendo con condizioni climatiche favorevoli.

Peronospora. Nel corso della settimana scorsa è stata osservata la comparsa di sporadiche manifestazioni della malattia con presenza di qualche macchia d'olio sulle foglie in vigneti di fondo valle o zone con esposizione a nord. Le attuali condizioni climatiche non sono favorevoli all'instaurarsi di nuove infezioni. Considerata la fase fenologica caratterizzata da elevata suscettibilità alla malattia con rapido accrescimento della vegetazione, si consiglia di ripristinare la protezione della vite allo scadere del turno del trattamento precedente, impiegando preferibilmente p.a. sistemici (*benalaxyl, benalaxyl m, metalaxyl m, fosetil Al, fosfonati di sodio, fosfonati di potassio, fluopicolide, oxathiapiprolin*), oppure principi attivi di solo copertura (*rame nelle sue varie formulazioni*) anticipando eventuali piogge infettanti, che con le temperature di questo periodo rendono la peronospora molto aggressiva.

Oidio. Le instabili condizioni climatiche della settimana scorsa sono state favorevoli allo sviluppo di questa malattia, mentre le attuali non sono favorevoli allo sviluppo di nuove infezioni. E' da prediligere l'utilizzo di un principio attivo di pari persistenza di quello antiperonosporico (*ibe, spiroxamina, penconazolo....*),

Tignoletta. Il volo della prima generazione sta terminando, un volo con poche catturate ma durato diversi giorni; infatti nelle zone ben esposte, sui grappoli sono già presenti le larve.

Varie.

- Portare a termine la palizzata dei germogli e attendere ad iniziare la cimatura.
- Con l'aumentare della vegetazione, si consiglia di trattare tutti i filari e di trattare con volumi d'acqua non inferiori a 300 litri/ettaro.
- **Si consiglia di trinciare l'erba dei terreni incolti e delle rive vicini a vigneti in produzione entro i primi giorni di giugno, per evitare di spostare eventuali insetti nocivi alla vite, dall'incolto al vigneto.**

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Parisi Nicola, cel. 3387504596

Federico cel. 338 5828793