



## BOLLETTINO DI DIFESA DELLA VITE

N° 6/2021 del 02/06/2021

**Fase fenologica.** Con le temperature massime di questa settimana in rialzo, i germogli di tutte le varietà aumentano il loro sviluppo. Tutte le varietà si stanno preparando alla fioritura. In zone ben esposte alcune varietà sono già in piena fioritura.

**Peronospora.** La pioggia prevista per il fine settimana scorsa non è caduta. In presenza di macchie sporulate basta una bagnatura fogliare notturna per far partire infezioni secondarie di *Plasmopara viticola*. In coincidenza alla fase fenologica delicata e dell'aumento delle temperature medie, **importante** mantenere protetta la vegetazione con prodotti di copertura, senza far scadere il p.a. e possibilmente anticipando le piogge previste ancora per il fine settimana. E' possibile usare prodotti ad azione sistemica (*benalaxyl M, metalaxyl M, fosetil Al, fosfonati di sodio, fosfonati di potassio, fluopicolide, oxathiapiprolin*), che permettono di proteggere il più possibile il grappolo e la vegetazione in rapida crescita. Si ricorda che, nel caso che le piogge infettanti cadono su vegetazione non protetta, è possibile l'impiego di prodotti contenenti *cimoxanil*, da effettuare entro 24-48 ore dall'evento infettante. Se compaiono i sintomi della malattia è opportuno usare p.a. con funzione eradicante come il *dimetomorf* e il *mandipromanid*.

In assenza di piogge infettanti e senza la presenza di malattia nel vigneto è possibile rispettare i tempi più lunghi consigliati per i p.a. utilizzati.

**Oidio.** In presenza della malattia, bastano le bagnature notturne per l'avvio di infezioni primarie (ascosporiche). Si raccomanda di aggiungere al trattamento antiperonosporico un prodotto antioidico a base di *ibe, fluxapiroxad, spiroxamina*, avendo cura di alternare p.a. caratterizzati da differente meccanismo d'azione

**Tignoletta:** Non sono ancora comparse le prime larve della tignoletta della prima generazione

### Varie.

- Nei vigneti in cui si nota la carenza di potassio o di scarso sviluppo dei germogli è consigliato l'utilizzo di concimi fogliari.
- Si raccomanda di usare le dosi massime ettaro consigliate in etichetta e di trattare con volumi d'acqua non inferiori a 300 litri/ettaro.
- Effettuare la trinciatura dell'erba solo a vegetazione ben protetta da p.a. antiperonosporici.
- Terminare i lavori di scacchiatura e spollonatura. Si consiglia di palizzare i germogli più lunghi, avendo cura di non cimare il germoglio.
- **Si consiglia di trinciare l'erba dei terreni incolti e delle rive vicini a vigneti in produzione entro la fine di maggio per evitare di spostare eventuali insetti nocivi alla vite, dall'incolto al vigneto.**

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Parisi Nicola cel. 3387504596, Federico cel. 338 5828793