



BOLLETTINO DI DIFESA DELLA VITE

N° 2/2023 del 04/05/2023

Fase fenologica. Il tempo instabile di inizio settimana con precipitazioni di circa 10 mm nelle giornate del 01-02 maggio con temperature medie non molto alte, la notte scendono ancora attorno ai 10°-12°, la vite ha proseguito la fase di sviluppo vegetativo, conservando differenze fra le zone più fredde e le zone meglio esposte dell'alta collina.

Peronospora – Le precipitazioni di inizio settimana possono aver favorito l'avvio del processo di germinazione delle oospore svernanti di *Plasmopara viticola* sul terreno, assumendo così il ruolo di piogge preparatorie. Le attuali previsioni annunciano tempo stabile fino a fine settimana, con piogge previste per inizio settimana prossima che potrebbero essere precipitazioni potenzialmente infettanti, in grado di disperdere l'inoculo, dando luogo a potenziali infezioni primarie. Visto un possibile incremento dello sviluppo vegetativo della vite con il rialzo delle temperature, si ritiene opportuno l'esecuzione di un trattamento preventivo cautelativo prima delle prossime piogge; ove sia già stato eseguito, si consiglia di ripristinare la protezione allo scadere del turno precedente del prodotto utilizzato, eventualmente in miscela con un p.a. citotropico.

Oidio. Con temperature attorno ai 10°C, piogge di almeno 2,5 mm e 15-20 ore di bagnatura costituiscono le condizioni ottimali per l'avvio di infezioni. Le precipitazioni di inizio settimana hanno generato condizioni di rischio crescente per l'avvio di infezioni primarie (ascosporiche). In questo periodo è consigliabile eseguire dei monitoraggi in campo per l'individuazione di eventuali sintomi di infezione. Pertanto, ove non sia già stato eseguito il trattamento antioidico, si raccomanda di eseguire un trattamento antioidico impiegando dosi/ettaro massime di zolfo bagnabile e nei vigneti ad alta suscettibilità della malattia si consiglia di intervenire con *meptyl-dinocap*, *spiroxamina* già dalle prime fasi del germogliamento.

Varie.

- Si consiglia di effettuare la manutenzione ordinaria sulle attrezzature per l'irrorazione dei trattamenti fitosanitari in vista della nuova stagione (pulizia ugelli e filtri, ecc.), e riportare l'operazione sul quaderno di campagna.
- E' importante rispettare e controllare le dosi riportate in etichetta e successivamente impiegate ad ettaro, nonché osservare la giusta distribuzione del fitofarmaco sulla vegetazione.
- Iniziare i lavori di scacchiatura e spollonatura.
- Con situazioni di alto rischio di infezioni peronosporiche, effettuare la trinciatura dell'erba solo a vegetazione ben protetta.
- Si raccomanda di segnalare la presenza e/o di chiedere un parere su eventuali sintomi di malattie o la presenza di patogeni per poter meglio elaborare i bollettini e aiutare i viticoltori nella difesa.
- Vista la presenza di molte viti colpite dai sintomi della Flavescenza Dorata nella passata stagione, verranno fatte delle segnalazioni mirate per rendere il più possibile efficaci i trattamenti insetticidi contro lo scafoideo

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Parisi Nicola, cel. 3387504596, Federico 338 5828793